

ÉPOCA DE MUESTREO FOLIAR												
FRUTALES												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Naranjos									■	■	■	
Almendro						■	■					
Cerezo							■	■				
Peral y Manzano							■					
Melocotonero							■					
Olivo*		■					■					
Vid (floración)					■	■						
Vid (envero)							■	■				
Pistacho								■				
HERBÁCEOS POR MES												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cereales				■								
Espárrago									■			
Maíz						■						
Alfalfa						■						
Algodón							■					
Remolacha					■	■	■	■				
Patata					■		■					
Fresa							■					
HERBÁCEOS POR ETAPA VEGETATIVA												
Berenjena	En la etapa de crecimiento vegetativo hasta plena floración. Hoja madura más joven en el tallo principal.											
Soja	En época de crecimiento vegetativo tomar la parte superior de toda la planta (de 15 a 20 plantas). En época de floración y hasta el inicio de la maduración de la vaina, tomar hojas maduras (trifoliadas) sin peciolo (de 20 a 30 hojas)											
Colza	Antes de la formación de semilla. Hoja recientemente madura. Recorrer 60 - 70 plantas											
Judía	En la etapa vegetativa antes de la maduración de la vaina. Tomar hojas recientemente maduras sin peciolo.											
Lechuga	Hojas completas, jóvenes o internas, medias y externas. Tamaño de la muestra 10 hojas (formación del cogollo) ó 20 hojas (plantas pequeñas)...											
Melón y sandía	Hoja joven recién formada (limbo+peciolo); 5ª ó 6ª hoja empezando por arriba. Tamaño de la muestra 15-20 hojas. En plántulas, con cuatro hojas, la 3ª hoja desde abajo.											
Pepino	Planta adulta. Quinta o sexta empezando por arriba. Limbo+peciolo. Evitar hojas adultas. Tamaño de la muestra 15-30 hojas.											
Pimiento	Planta adulta. Quinta o sexta empezando por arriba. Limbo+peciolo. Evitar hojas adultas. Tamaño de la muestra 15-30 hojas.											
Tomate	Hoja completa (limbo+peciolo) de planta adulta; cuarta hoja empezando por arriba. Tamaño de la muestra 20 hojas.											
Ajos y Cebollas	Parte aérea de la planta entera en todas las etapas de desarrollo. Tomar entre 10 - 15 plantas.											

Para obtener más información sobre épocas de muestreo, material que se debe tomar y cantidad, puede consultar nuestra web en el apartado **TOMA DE MUESTRAS**

* Gracias al Sistema de Diagnóstico y Recomendación Integrado (DRIS) que empleamos en Análisis Foliar Olivo, se pueden tomar muestras durante todo el ciclo anual.